

LSV Silomais 2015 Baden-Württemberg - Grenzlagen

Orte: Döggingen, Sonderbuch

Sorte	S-Zahl	SK	BD je qm	Ertrag				Energie-				Stärke-				Verdaulichkeit		
				FM dt/ha	TS gesamt		TM		gehalt NEL MJ		ertrag NEL MJ		gehalt		ertrag		ElosT %	rel.
					TS %	rel.	dt/ha	rel.	je kg TS	rel.	je ha	rel.	% TS	rel.	dt/ha	rel.		
Mittel alle Sorten		2	9,0	425,6	40,2	100	169,5	100	7,33	100	124319	100	41,6	100	70,3	100	78,1	100
GD 5%				35,0	2,1		14,3		0,14		10833		4,3		9,6		1,6	
Amagrano	~S220	2	9,0	426,2	39,0	97	166,2	98	7,53	103	125178	101	45,7	110	75,5	107	79,5	102
Ambition*	~S190	2	9,0	420,5	40,8	102	171,7	101	7,49	102	128629	103	43,0	103	73,6	105	79,1	101
Barman*	~S200	2	9,0	406,5	39,8	99	161,5	95	7,31	100	118127	95	41,2	99	66,5	95	77,5	99
Beethoven*	~S200	2	9,0	429,0	39,5	98	169,0	100	7,34	100	124170	100	41,2	99	70,1	100	78,2	100
Belami CS*	~S190	2	9,0	433,0	40,5	101	175,1	103	7,42	101	130107	105	42,1	101	73,9	105	79,5	102
Cathy*	S210	2	9,0	466,3	38,1	95	177,2	105	7,31	100	129543	104	38,6	93	68,5	97	78,1	100
DKC 3333*	S200	2	9,0	428,3	39,9	99	170,7	101	7,36	100	125639	101	41,3	99	70,5	100	79,5	102
Emmerson*	~S170	2	9,0	278,0	48,2	120	133,9	79	7,30	100	97711	79	46,5	112	62,2	88	78,7	101
Laurinio	~S220	2	9,0	510,7	35,3	88	180,2	106	7,24	99	130501	105	37,9	91	68,5	97	76,0	97
Monty*	~S190	2	9,0	418,3	40,5	101	169,5	100	7,43	101	125898	101	42,6	102	72,2	103	79,3	101
Osterbi CS*	S200	2	9,0	431,2	38,7	96	166,7	98	7,29	100	121642	98	38,8	93	64,8	92	77,1	99
P 8105*	~S180	2	9,0	388,0	43,7	109	169,1	100	7,35	100	124305	100	43,3	104	73,3	104	77,5	99
Schobbi CS	S200	2	9,0	422,7	41,5	103	174,9	103	7,29	99	127487	103	42,4	102	74,1	105	78,0	100
Sulano/DS419	~S200	2	9,0	495,5	37,8	94	187,1	110	7,19	98	134427	108	38,9	93	72,5	103	76,5	98
Sunbeam/DS11	S200	2	9,0	429,8	39,5	98	169,6	100	7,15	98	121427	98	40,5	97	68,8	98	77,3	99

Orte: Döggingen, Sondert Fortsetzung - Bonituren

Sorte	S-Zahl	SK	Mängel Aufgang 1 - 9	Kälteempf- indlichkeit 1 - 9	Frit- fliege %	Stängel- bruch %	Virus 1 - 9	Helmintho- sporium 1 - 9	Rost 1 - 9	Abreife Blätter 1 - 9	Bestok- kung %	Stängel- fäule %	Beulen- brand %	Mais- zünsler %	Lager bei Ernte %
Mittel alle Sorten		2	1,6	4,7				1,4		5,2	2,9		1,6	5,9	0,9
GD 5%															
Amagrano	~S220	2	1,7	3,7				1,0		5,3	2,7		2,5	6,2	0,0
Ambition*	~S190	2	1,5	4,0				1,0		5,3	2,3		1,2	4,5	0,0
Barman*	~S200	2	2,2	4,7				2,7		4,0	3,7		1,6	6,2	0,0
Beethoven*	~S200	2	1,2	4,3				1,7		5,3	2,9		1,2	4,1	0,0
Belami CS*	~S190	2	1,3	4,7				1,7		6,3	3,1		1,6	3,9	12,6
Cathy*	S210	2	1,7	5,3				1,0		3,7	2,7		1,2	4,5	0,0
DKC 3333*	S200	2	2,0	5,0				1,3		4,7	3,1		1,2	4,5	0,0
Emmerson*	~S170	2	1,5	4,7				1,7		7,7	3,1		1,2	8,4	0,2
Laurinio	~S220	2	1,3	6,3				1,7		4,0	2,7		2,0	8,8	0,2
Monty*	~S190	2	1,7	5,3				1,3		5,0	3,3		1,2	4,3	0,0
Osterbi CS*	S200	2	1,8	5,3				2,0		5,7	3,7		1,6	3,3	0,0
P 8105*	~S180	2	1,5	4,7				1,0		5,3	3,1		1,6	7,3	0,0
Schobbi CS	S200	2	1,7	4,3				1,0		5,7	2,7		1,6	6,1	0,0
Sulano/DS419	~S200	2	2,0	4,7				1,0		4,7	2,3		2,1	8,4	0,0
Sunbeam/DS11	S200	2	1,5	6,0				1,7		5,0	2,7		1,2	8,6	0,0