



SORTENRATGEBER MAIS MITTELFRÜH (S230 bis S250)

Sorte	Nutzungsempfehlung	zugelassen seit.....	Pflanzenlänge	Kälteresistenz in der Jugend	Standfestigkeit	Resistenz gegen Stängelfäule	Silo- und Biomassemais LSV 2013-2014						Körnermais LSV 2010-2014			
							Siloreifezahl	Stärkegehalt rel,	ElosT rel,	Energieertrag rel,	TM-Gesamtpflanze %	TM-Ertrag rel,	Körnerreifezahl	TM-Korn rel,	Korntrag rel,	Bruchkornanteil % LSV 2013
Amamonte		2011	l/s.l	(+)	(+)	(+)	S250	99	99	101	35,0	101	K240	100.3	98.1	4.0
Carolinio KWS		2013	l/s.l	0	+		S230	98	98	97	36,3	98	-			
DKC 3409 EU	BM	2010	l/s.l	0	+		S240	88	95	102	33,9	107	-			
DKC 3795 EU		2010	m/l	(+)	+	++	-						K250	99.0	100.3	3.1
ES Cirrius	KM	2011	l/s.l	0	(+)	+	-						K230	103.5	99.1	3.9
Farmanager ¹⁾	SM, BM	2013	l	(+)	(-)	0	S230	98	98	100	37,9	101	K220			6.2
Geoxx EU	BM	2010	l/s.l	(+)	+		S240	94	98	102	35,2	104	-			
Grosso	KM	2010	l	(+)	+	+	S250	96	96	102	34,5	105	K250	98.6	101.7	5.0
Jessy	BM	2010	l	(+)	+		S230	94	99	102	34,9	105	-			
LG 30224		2012	m/l	(+)	+		S230	102	103	96	36,4	95	-			
LG 30249		2013	s.l	(+)	+	+	S240	97	99	99	36,0	101	K250	100.6	99.8	2.8
LG 30251	SM	2013	m/l	(+)	++		S250	99	103	101	35,7	100				
Luigi CS	KM	2010	m/l	0	(+)	+	-						K240	101.0	100.2	2.5
Millesim EU	KM	2011	l	(+)	+	++	S240						K250	99.9	102.2	4.6
Niklas	SM, BM	2012	l	(+)	(+)		S230	98	100	103	36,6	104	-			
P 8025	SM, BM	2013	m/l	0	+		S240	103	101	103	35,6	102	-			
P 8134	KM	2013	l	(+)	+	(+)	-						K250	98.8	108.7	3.3
P 8400		2011	l	(+)	+	(+)	-						K240	101.0	100.2	3.1
P 8589	KM	2012	l/s.l	(+)	(+)	+	-						K250	100.2	106.8	3.8
P 8609 ¹⁾	BM	2013	l	0	+	++	S250	93	98	101	34,1	105	K260			2.8
P 8745 EU		2010	l	0	++	(+)	-						ca. K250	101.2	100.8	3.8
Renatinio		2013	l	0	+	++	-						K250	99.3	98.5	3.1
Ricardinio ¹⁾	KM	2008	l	0	+	+	S230						K220	100.0	101.7	4.1
Sixtus EU	KM	2011	l/s.l		+	+	-						K250	99.4	105.1	5.2
Sunstar	SM, BM	2012	l	(+)	+	++	S240	97	100	101	36,0	102	K250			
Toninio	SM, BM	2012	s.l	0	0	+	S230	97	97	104	36,2	106	K240			3.2
Torres ¹⁾	SM	2007	l	(+)	+	+	S250	102	101	102	35,4	100	K260	102.0	96.1	4.4

LtZ Augustenberg, LAZBW Aulendorf, BSL 2014

Die Einstufung der Sorteneigenschaften erfolgte primär nach der Beschreibenden Sortenliste, Bei Abweichungen zwischen Körner- und Silonutzung ist die Benotung für Körnernutzung angegeben.

Nutzungsempfehlung 2015: BM Biomassemais, KM Körnermais, SM Silomais

¹⁾ Die LSV-Ergebnisse wurden im jeweiligen nutzungsspezifischen Reifesortiment ermittelt.

Die Helminthosporium-Blattdürre ist in Befallsgebieten zusätzlich zu beachten, Nähere Hinweise sind erhältlich beim Regierungspräsidium Freiburg.



IMPRESSUM

Herausgeber:
Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg (LTZ)
Neßlerstr. 25
76227 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 9468-0
Fax: 0721 / 9468-209
eMail: poststelle@ltz.bwl.de
Internet: www.ltz-augustenberg.de

Bearbeitung und Redaktion:
LTZ Augustenberg
Ref. 13, Saatgutenerkennung und Versuchswesen
Dr. Christine Amann

Stand: Dezember 2014