



SORTENRATGEBER MAIS MITTELSPÄT (über S250)

Sorte	Nutzungsempfehlung	zugelassen seit ...	Pflanzenlänge	Kälteresistenz in der Jugend	Standfestigkeit	Resistenz gegen Stängelfäule	Silo- und Biomassemais LSV 2013-2014						Körnermais LSV 2010-2014				
							Siloreifezahl	Stärkegehalt rel.	EloST rel.	Energieertrag rel.	TM-Gesamtpflanze %	TM-Ertrag rel.	Körnerreifezahl	TM-Korn rel.	Korntrug rel.	Bruchkornanteil % LSV 2013	
Agro Vitallo		2013	s.l	(+)	(+)		S270	92	96	102	34,2	105	-				
Atlas	BM	2011	s.l	(+)	0		S280	95	97	105	33,2	109	-				
Biriati CS EU		2011	l/s.l	(+)	+		S290	94	97	102	32,8	104	-				
Danubio	SM, BM	2013	l/s.l	(+)	(+)		S270	100	100	104	33,3	105	-				
DKC 4490 EU	KM	2007	m/l	0	++	++	-						K290	99.0	105.9	2.9	
ES Charter	SM, BM	2010	l	(+)	++	++	S270	95	99	105	34,4	106	K250				
ES Yeti	BM	2013	s.l	(+)	(+)		S280	91	98	108	33,1	108	-				
Futurixx EU	KM	2010	l/s.l	(+)	+	+	-						K290	99.1	110.9	1.5	
KWS 9361		2012	l	(+)	+	++	-						K280	100.5	102.7	2.0	
LG 30306 EU		2011	l/s.l	(+)	+		S280	95	95	101	32,3	106	-				
NK Silotop	SM	2009	m/l	(+)	+		S260	107	101	99	34,9	99	-				
Obixx EU	KM	2011	l/s.l		+	++	-						K280	100.2	107.2	1.7	
Oxygen EU		2010					ca. S280						K280	98.3	104.1	1.9	
P 8213	SM, BM	2013	l/s.l	(+)	(+)		S260	98	99	104	34,6	104	K280				
P 9027	SM	2012	l	(+)	+		S260	104	97	99	34,6	102	-				
P 9400 EU	KM	2008	l/s.l	(+)	+	++	-						K270	103.1	102.2	2.9	
P 9494 EU	KM	2009	l	(+)	+	+	-						K280	99.7	107.9	3.1	
Palmer		2010	l/s.l	(+)	+		S290	93	94	100	30,7	105	-				
Pauleen	BM	2013	l/s.l	(+)	(+)		S280	96	97	104	33,9	108					
PR 37 Y 12 EU	KM	2007	l			++	-						K290	99.8	104.9	3.0	
PR 38 Y 34 EU	BM	2007	l	0	+		S270	93	95	104	33,3	108	-				
PR 39 F 58	SM	2003	l	0	+	+	S260	108	99	98	33,9	99	K250				
Sunmark/DS0331	SM	2012	m/l	(+)	++		S270	110	100	99	33,2	97					
Susann		2009	l	0	(+)	+	S260						K280	97.6	103.1	3.0	
Suzy		2010	m/l	(+)	+	0	-						K260	100.4	100.9	1.9	
SY Santacruz		2011	m/l	0	(+)		S270	99	101	95	32,3	95	-				

LTZ Augustenberg, LAZBW Aulendorf, BSL 2014

Die Einstufung der Sorteneigenschaften erfolgte primär nach der Beschreibenden Sortenliste. Bei Abweichungen zwischen Körner- und Silonutzung ist die Benotung für Körnernutzung angegeben.

Nutzungsempfehlung 2015: BM Biomassemais, KM Körnermais, SM Silomais

Die Helminthosporium-Blattdürre ist in Befallsgebieten zusätzlich zu beachten. Nähere Hinweise sind erhältlich beim Regierungspräsidium Freiburg.



IMPRESSUM

Herausgeber:
Landwirtschaftliches Technologiezentrum
Augustenberg (LTZ)
Neßlerstr. 25
76227 Karlsruhe

Tel.: 0721 / 9468-0
Fax: 0721 / 9468-209
eMail: poststelle@ltz.bwl.de
Internet: www.ltz-augustenberg.de

Bearbeitung und Redaktion:
LTZ Augustenberg
Ref. 13, Saatgutenerkennung und Versuchswesen
Dr. Christine Amann

Stand: Dezember 2014