


LSV Körnermais NRW 2014 (Mittel aus 7 Standorten)
Ertrag dt/ha und Trockensubstanzgehalt %



4 Sortenempfehlung Körnermais und CCM, Nordrhein-Westfalen 2015 (vorläufig)

		Empfehlung und Beurteilung														2014 Probeanbau									
		nach 3 Prüffahren							nach 2 Prüffahren							nach einem Prüffahr									
Körnerreifezahl		Ertrag	Marktleistung	Abreife	Wuchshöhe	Stängelfäule	Lagerneigung	Turcicum	Ertrag	Marktleistung	Abreife	Wuchshöhe	Stängelfäule	Lagerneigung	Turcicum	Ertrag	Marktleistung	Abreife	Wuchshöhe	Stängelfäule	Lagerneigung	Turcicum			
trübes Sortiment (bis K 220)	K 200	Laurinio	o	+	+	-	o	-	o																
	K 210	Amagrano	o	+	+	+	o	+	-	Sunshinos	-	o	+	++	-	+	(-)								
	K 220	Colisee LG 30222 Ricardinio	o - +	o o ++	o o o	o + o	o - +	o o +	o + -								Panvinio SY Werena	++ +	o ++	o o	o -	o -	+	+	()
mittelsfrühes Sortiment	K 230	LG 30233 Tiberio	o +	o +	o o	o o	o ++	o +	o o							KWS 2322	++	++	o	o	++	++	()		
	K 240	Amamonte Farmgold*	o o	o o	o o	o +	o +	o o	- o	Rivaldinio	++	o	-	o	++	+	(o)	ES Metronom Kultivas	++ ++	++ ++	o -	o -	++ o	++ -	()
		Toninio	++	+	o	-	o	-	o																
		Alduna* Grosso P 8589	o o +	o o -	o o -	o o -	o +	o +	o +		Claudinio LG 30249 Milesim* P 8134 P 8433 Sixxtus*	++ o + ++ o o	o o o -	- o -	- o o	o ++ +	- + o	(-) (o) (-) (+) (+) (+)							
	K 250		o	o	o	o	o	+								P 9027	++	-	-	o	+	+	(+)		

Die Sorteneigenschaften wurden für die Empfehlung sortimentsübergreifend verrechnet und relativiert.

Turcicum: Werte in () Lfl Bayern

Beurteilungsschema:

+ = überdurchschnittlich, o = durchschnittlich, - = unterdurchschnittlich

z.B.: + = Wuchs kürzer, Anfälligkeit für Stängelfäule und Turcicum geringer, Lagerneigung geringer; () = keine Einstufung

Bewertung der LSV-Prüffahre:

relativ 99 - 101 = o; bis rel. 104 bzw. 96 = + bzw. -; ab rel. 105 bzw. 95 ++ bzw. --

*EU-Sorte